

Proprietary Name and Dosage Form

Linctagon Throat Lollies (Lozenges)

Composition

Active Ingredients	Per lolly (7 g)	% RDA# per lolly
<i>Pelargonium sidoides</i> Extract (4:1)	40 mg	*
Echinacea Extract (4:1)	12,5 mg	*
Ginger Oil	8 mg	*
Zinc	3 mg	20%
Menthol Oil	1.8 mg	*

Recommended Daily Allowance for persons 4 years and older.

* RDA not established.

Pharmacological Classification

A34: Other

Indication

Linctagon Throat Lollies can support the body to curb throat irritation during infections associated with colds and flu. Efficacy of support may vary between users.

Contraindication

Do not use if known sensitivity or allergy exists towards any of the ingredients.

If in doubt, ask your pharmacist or medical practitioner.

Warnings

Do not use continuously for more than 6 days. Not suitable for children under 2 years.

Patients on anticoagulants or anti-platelet medication should use this product with caution as *Pelargonium sidoides* and ginger may have a blood thinning effect.

Not suitable for people with diabetes. Do not use if known sensitivity or allergy exists towards any of the ingredients. Do not exceed the recommended daily dosage.

Do not use after date of expiry.

Porphyria: Safety has not been established.

STORE OUT OF REACH OF CHILDREN.

Interactions

Patients on anticoagulants or anti-platelet medication should use this product with caution as *Pelargonium sidoides* and ginger may have a blood thinning effect, and therefore can potentiate the effect of the medication. Products containing herbal ingredients may interact with some medication. If you are taking chronic medication, do not use this product without consulting your medical practitioner.

Pregnancy and Lactation

Safety for use during pregnancy and lactation has not been established.

Dosage and Directions for Use

Do not exceed recommended daily dosage. Do not use continuously for more than 6 days. Not suitable for children under 2 years. Not suitable for people with diabetes.

Children 2 – 6 years of age:

Suck one lolly twice daily.

Children 7 – 12 years of age:

Suck one lolly three times a day.

Side Effects and Special Precautions

If you experience any side effects or sensitivity towards any of the ingredients, discontinue use. If symptoms persist, or if any adverse reactions occur, stop using this supplement and consult a medical practitioner. Symptoms of allergy may include skin rash and gastrointestinal discomfort.

Known Symptoms of Overdosage and Particulars of Its Treatment

Do not exceed the recommended dosage. If an accidental overdose occurs, please consult a medical practitioner. Symptoms may include, but are not limited to, skin rash, gastrointestinal discomfort, diarrhoea and nausea. Treatment is symptomatic and supportive.

Identification

Hard, red, round lozenge on a white plastic stick.

Presentation

12 Individually wrapped lollies, sealed in a plastic bag, in a unit carton.

Storage Instructions

Store below 25°C. Store away from moisture and direct sunlight.

STORE OUT OF REACH OF CHILDREN.

Complementary Registry Number

To be allocated

Name and Business Address of Applicant

Nativa (Pty) Ltd

Private Bag X1030, Lyttelton, 0140, South Africa

Tel: +27 (0) 12 664 7110 • Fax: +27 (0) 12 664 8031

Customer Care Line: **0860 NATIVA (628 482)**

E-mail: health@nativa.co.za

Website: www.nativa.co.za

Mobile site: www.nativa.mobi

Date of Publication of the Package Insert

July 2011

PPIL097/02

Eiendomsnaam en Doseervorm
Linctagon Throat Lollies (Suigtablette)

Samestelling

Aktiewe Bestanddele	Per suigtablet (7 g)	% RDA# per suigtablet
<i>Pelargonium sidoides</i> Ekstrak (4:1)	40 mg	*
Echinacea Ekstrak (4:1)	12.5 mg	*
Gemmerolie	8 mg	*
Sink	3 mg	20%
Mentoololie	1.8 mg	*

Aanbevole Daaglikse Toelaag vir persone 4 jaar en ouer.

* ADT nie vasgestel nie.

Farmakologiese Klassifikasie

A34 : Ander

Indikasie

Linctagon Throat Lollies kan die liggaam ondersteun om keel-irritasie te beperk tydens infeksies wat met verkoue en griep geassosieer word. Effektiwiteit van ondersteuning kan verskil tussen gebruikers.

Kontra-indikasie

Persone met 'n hipersensitiewe of allergieë vir enige bestanddele moet nie die produk gebruik nie. Indien jy twyfel, vra jou apteker of geneesheer.

Waarskuwings

Moet nie vir meer as 6 dae aaneenlopend gebruik word nie. Nie geskik vir gebruik deur kinders onder die ouderdom van 2 jaar nie. Hierdie produk moet met versigtigheid geneem word deur pasiënte wat antikoagulate- of bloedverduunningsmedikasie gebruik, *Pelargonium sidoides* en gemmer kan moontlik die effek van hierdie medikasie verhoog. Persone met 'n hipersensitiewe of allergieë vir enige bestanddele moet nie die produk gebruik nie. Moet nie die aanbevole daaglikse dosis oorskry nie. Die produk moet nie gebruik word nadat die vervaldatum reeds bereik is nie.

Porfirie: Veiligheid vir gebruik is nog nie vasgestel nie.

STOOR BUITE DIE BEREIK VAN KINDERS.

Interaksies

Hierdie produk moet met versigtigheid geneem word deur pasiënte wat antikoagulate- of bloedverduunningsmedikasie gebruik, *Pelargonium sidoides* en gemmer kan moontlik die effek van hierdie medikasie verhoog. Produkte wat kruidenbestanddele bevat kan interaksie toon met sommige medikasie. Indien u enige chroniese medikasie gebruik moet nie hierdie produk gebruik sonder om u geneesheer te raadpleeg nie.

Swangerskap en Laktasie

Veiligheid is nog nie vasgestel vir gebruik tydens swangerskap en laktasie nie.

Dosis en Gebruiksaanwysings

Moet nie die aanbevole daaglikse dosis oorskry nie. Moet nie vir langer as 6 dae aaneenlopend gebruik nie. Nie geskik vir gebruik deur kinders jonger as 2 jaar nie.

Kinders 2 – 6 jaar:

Suig een suigstokkie twee keer per dag.

Kinders 7 - 12 jaar:

Suig een suigstokkie drie keer per dag.

Neuwe-Effekte en Spesiale Voorsorgmaatreëls

Indien enige nuwe-effekte of sensitiewe teenoor enige van die bestanddele voorkom, staak gebruik. Indien simptome voortduur of nadelige reaksies ondervind word vra u dokter vir advies. Allergiese simptome kan veluitslag en gastroïntestinale ongemak insluit.

Bekende Simptome van Oordosering en Behandeling

Moet nie die aanbevole daaglikse dosis oorskry nie. Indien 'n toevallige oordosis voorkom, raadpleeg 'n geneesheer. Simptome van oordosering kan insluit, maar is nie beperk tot, veluitslag, gastroïntestinale ongemak, diaree en naarheid. Behandeling is simptome en ondersteunend.

Identifikasie

Harde, rooi, ronde suigtablet op 'n wit plastiekstokkie.

Aanbieding

12 Suigstokkies individueel toegedraai, geseël in plastieksak, in 'n eenheidskarton.

Bergingsaanwysings

Bewaar benede 25°C. Bewaar weg van vog en direkte sonlig.

STOOR BUITE BEREIK VAN KINDERS.

Komplementêre Registrasienommer

Moet toegeken word.

Naam en Besigheidsadres van Applikant

Nativa (Edms) Bpk
Privaatsak X1030, Lyttelton, 0140, Gauteng, Suid Afrika
Tel: +27 (0)12 664 7110 • Faks: +27 (0)12 664 8031
Verbruikershulplyn: **0860 NATIVA (628 482)**
E-pos: health@nativa.co.za
Webblad: www.nativa.co.za
Mobi-blad: www.nativa.mobi

Datum van Publikasie van die Voubiljet

Julie 2011

PPIL097/02